

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: AMPICILLIN

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

STYRKE / PAKNING:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 g injektionssubstans. • 2 g injektionssubstans. 	VIRKNING:	Antibioticum af penicillin-gruppen med bredspektret virkning.
INDIKATION:	Alvorlige infektioner med ampicillinfølsomme bakterier.	BIVIRKNING:	Allergiske reaktioner. Krydsallergi over for andre penicilliner.
INTERAKTION:	Virningen hæmmes af samtidig indgift af bakteriostatisk præparater f.eks. Erythromycin.	KONTRAINDIKATION:	<ul style="list-style-type: none"> • Kendt allergi over for penicillin. • Mononukleose.
DOSERING:	<ul style="list-style-type: none"> • voksne: 1 g i.v. 3-4 gange dgl. Evt. i.m. • børn: 50-100 mg/kg i.v. 3-4 gange dgl. 	INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:	<p>Injektionsvæsken kan gives langsomt i.v. enten direkte i kanylen el. i membranen til isotonisk NaCl.</p> <p>1-2 g opløses i 5-10 ml sterilt vand.</p> <p>Gives som bolusinjektion over nogle minutter.</p>
SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:	Ampicillin bør ikke blandes med andre farmaka på grund af uforlidelighed.	EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:	<p>NaCl isotonisk 9 g/l</p> <p>Opl. til inj. kan opbevares 24 timer i køleskab. Infusionsblandingen holdbar i 12 timer.</p>
EVT.		INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:	<p>2 g i 10 ml sterilt vand fortyndes i 100 ml NaCl isot.</p> <p>Indgives over 30 min</p>