

GLUKOKORTIKOIDER

GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Afdelingen anvender kun i meget begrænset omfang glukokortikoider i led. Injektion i et led kan gentages efter 6 uger. Der må højst gives 3-4 injektioner på et år.

INDIKATION

- Mono- eller oligoarthritis ved RA.
- Mono- eller oligoarthritis ved:krystalarthritis
post-traumatisk arthritis
reaktiv arthritis
psoriatisk arthritis
andre aseptiske inflammatoriske ledlidelse
- Osteoarthrose med tegn på lokal ledinflammation

KONTRAINDIKATIONER

Absolutte:

- Intraartikulær eller periartikulær infektion
- Bakterieæmi
- Intraartikulær fraktur

Relative:

- Ledinstabilitet
- Svær jukstaartikulær osteoporose
- Manglende effekt af tidl. injektioner
- Hæmoragisk diatese
- Septisk arthritis
- Stigning i lokal inflammation efter injektion
- Progressiv leddskade (bruskskade og avaskulær knoglenekrose)
- Lokal vævsatrofi
- Seneruptur
- Flushing
- Abnorm blødning fra uterus
- Eosinopeni, lymfopeni og neutrocytose
- Stigning i BS hos patienter med diabetes mellitus.

VEJLEDENDE DOSER

Præparatnavn	små led	mellemstore led	store led
Decadron	0.8 - 1.2 mg	4 mg	8 mg
Celeston	0.75 - 1.5 mg	1.5 - 3 mg	3 - 6 mg
Diprospan	1.4 - 2.1 mg	4 - 7 mg	7 - 14 mg
Depo-Medrol	4 - 12 mg	20 - 40 mg	40 - 80 mg
Kenolog	2 - 3 mg	15 - 20 mg	30 - 40 mg
Lederspan	2 - 3 mg	5 - 10 mg	10 - 20 mg