

Retningslinjer for henvisning til det ortopædiske ambulatorium i Thisted

Vi har aktuelt et problem med at finde ledige tider til relevante efterkontroller for forundersøgelser i ambulatoriet. Jeg har derfor aftalt med ledelsen i Aalborg, at vi udfærdiger en list over hvilke forløb, som ikke må henvises. Patienter, hvis læsion kræver indlægges, henvises i henhold til plan.

Følgende patienter må ikke fra skadestuen henvises til det ortopædiske ambulatorium:

- Patienter til secund opinion. Beslutning skal tages i skadestuen i samråd med den ortopædiske bagvagt
- Til primær vurdering for løshed af specielt knæ og tommelens MP-led. Løshed afgøres i skadestuen evt. i LA.
- Patienter hvis skade er over 14 dage gammel. Skal henvises til fællesvisitationen i Aalborg.
- Rygtraumer og smerter, hvor der ikke er tale om fraktur. Behandles via. e.l.
- Distorsioner, hvor der ikke er tale om fraktur. Behandles via. e.l.
- Rheumatiske sygdomme og overbelastningssyndromer. Behandles via. e.l.

Bemærk følgende ændring af behandlingsforløb:

- Dropfinger henvises ved den primære behandling i skadestuen til ERGO efter 6 uger. Skinne med velcro må ikke anvendes. Skal tapes med frit PIP led.
- Kontrol af stabile distale radius frakturer med reposition kontrolleres kun 1 gang med røntgen efter 12 til 14 dage.
- Opererede distale radius frakturer kontrolleres ikke i kirurgisk ambulatorium med henvises efter 14 dage til ERGO, som fjerner suturer, påsætter ortose og instruerer i øvelser. Afsluttes via ERGO
- Knaphulslæsioner immobiliseres og henvis til kontrol og videre behandling i ERGO hurtigst muligt.