

ANVENDELSE AF PRÆPARATET MORFIN

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

STYRKE / PAKNING:	<ul style="list-style-type: none"> • 10 mg/ml injektionsvæske. 1 ml ampuller. • 20 mg/ml injektionsvæske. 1 ml ampuller • hætteglas á 10 mm og 50 ml 	VIRKNING:	Analgeticum af morfintypen.
INDIKATION:	Stærke smerter, cancersmerter. Præoperativ medikation og postoperativ analgesi.	BIVIRKNING:	Toleransudvikling, kvalme, opkastning, svimmelhed, eufori, vandladningsbesvær, obstipation og kløe. Udvikling af fysisk afhængighed efter nogle ugers indtagelse.
INTERAKTION:	Sammen med alkohol, hypnotica eller sedative psykofarmaca svækkes bevidsthed og respiration yderligere.	KONTRAINDIKATION:	Astma bronchiale og kroniske lungelidelser med respirationsinsufficiens.
DOSERING:	2.5 - 5 mg i.v. Kan i sjældne tilfælde gives som kontinuerlig infusion, fortrinsvis ved terminalpatienter.	INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:	i.v., i.m. eller s.c.
SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:	Anvendes også epiduralt, evt. kombineret med bupivacain. Hertil findes færdigblandet opløsninger.	EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:	<ul style="list-style-type: none"> • NaCl isotonisk 9 g/l • Glucose isotonisk 55 g/l 12 timer
EVT.		INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:	Den færdige infusionsblanding beskyttes mod lys.