

PROFYLAKTISK BEH. AF TETANUS-DIFTERI I SKADESTUEN

<p>STYRKE / PAKNING:</p>	<p>Injektionsvæske á 0,5 ml</p>	<p>VIRKNING:</p>	<p>Immunitet over for Tetanus og Difteri.</p>
<p>INDIKATION:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ethvert sår herunder stiklæsion, excoriation, forbrænding og traumer med devitaliseret væv skal betragtes som et focus for tetanus. Alle, som ikke er vaccineret, skal tilbydes dette (VAT) samt revaccination mod difteritis. <u>Revaccination alene mod difteri er ikke et skadestueanliggende.</u> Gives af sygeplejersken. Vaccination mod difteri udskydes hvis der forefindes aktuel febril lidelse. 	<p>BIVIRKNING:</p>	<p>Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet samt almen reaktioner i form af hovedpine, utilpashed og feber. Anafylaktiske reaktioner sjældne.</p>
<p>INTERAKTION:</p>	<p>Må ikke blandes med andre stoffer/vacciner.</p>	<p>KONTRAINDIKATION:</p>	<p>Acut febrilia, tidl. allergisk reaktion over for vacciner.</p>
<p>DOSERING:</p>	<p>1 ml gives dybt s.c.</p>	<p>INJEKTIONSMÅDE INJEKTIONSSTED INJEKTIONSHASTIGHED:</p>	<p>Dybt. s.c. eller i.m. S.c. i regio suprascapularis. Gives i modsatte side af TAT. give langsomt. Injektionsstedet masseres.</p>
<p>SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:</p>	<p>Alle ptt. som modtager VAT skal observeres for anafylaktiske reaktioner. Pt. må 30 min. efter inj. ikke lades alene i venteværelse m.v herunder transport i huset. Der skal være konstant opsyn af en person, som kan tilkalde hjælp. Inj. kan med fordel gived ved start af beh. så observationstiden indgår i behandlingstiden.</p>	<p>TILBEREDNING</p>	<p>Omrystes grundigt. Må ikke blandes med andre stoffer i samme sprøjte.</p>

EVT.	Pt. skal informeres om evt. gener.		
-------------	------------------------------------	--	--

Retningslinier for VAT+DIFTERI

STATUS	DEFINITION	Immunitet år	VAT/DIFTERI
Fuldt vaccineret	<ul style="list-style-type: none"> • Børn/voksne < 40 år med prim. vaccinationsserie • Børn/voksne < 40 år med prim. vaccinationsserie + revacc efter inden 5 år efter prim. vacc. • Børn/voksne < 40 år med prim. vaccinationsserie + revacc over 5 år efter prim. vacc. • Børn/voksne > 40 år med prim. vaccinationsserie • Børn/voksne > 40 år med prim. vaccinationsserie + revacc efter inden 5 år efter prim. vacc. • Børn/voksne > 40 år med prim. vaccinationsserie + revacc over 5 år efter prim. vacc. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 20 • 10 • 5 • 15 • 10 	NEJ
Ikke fuldt vaccineret	Udløb af immunitet. Kun 2 eller færre vaccinationer. Manglende oplysninger om vaccination.		JA
Alle	Ekstremt store blodtab, uafhængig af vaccination Der gives 500-1000 enheder :		JA

Behandling af akutte anafylaktiske reaktioner :

ADRENALIN-DOSIS (å 1 mg/ml) :		
Voksne	Der gives 0,6 ml i.m. - injektionsstedet masseres	
Børn	11 - 15 år	0,4 ml
	6 - 10 år	0,3 ml
	1 - 5 år	0,2 ml
	Under 1 år	0,1 ml