

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: ROCEPHALIN CEFTRIAXON

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

<p><b>STYRKE / PAKNING:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.5 og 1 g injektionssubstans i hætteglas.</li> <li>• 2 g infusionsubstans</li> </ul>	<p><b>VIRKNING:</b></p>	<p>Bredspektret langtidsvirkende antibioticum af cefalosporingruppen. Baktericid over for grampos. og gramneg. bakterier.</p>
<p><b>INDIKATION:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alvorlige infektioner som sepsis.</li> <li>• Specielt hos pt. med penicillinallergi. Infektion med meticillinfølsomme bakterier.</li> <li>• Profylakse ved meningokoksygd.</li> <li>• Gonorrhoea</li> </ul>	<p><b>BIVIRKNING:</b></p>	<p>Thromboflebit og diarré</p>
<p><b>INTERAKTION:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virkningen hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk præp. (f. eks. Erytromycin).</li> <li>• Virkningen øges ved samtidig indgift af aminoglykosider.</li> <li>• Loopdiuretica og aminoglykosider kan potensere nefrotoksiciteten.</li> </ul>	<p><b>KONTRAINDIKATION:</b></p>	<p>Forsigtighed skal udvises ved penicillin-allergikere, da de sensibiliseres lettere.</p>
<p><b>DOSERING:</b></p>	<p>1 - 2 g i.v. 1 gang i døgnet.</p>	<p><b>INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:</b></p>	<p>I.v. gives langsomt. Opløses i medfølgende solvens. Indgives over 2-4 min.</p>
<p><b>SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:</b></p>	<p>Allergi. Speciel forsigtighed ved penicillin-allergikere.</p>	<p><b>EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NaCl isotonisk 9 g/l</li> <li>• Glucose isotonisk 55 g/l</li> </ul> <p>6 timer</p>
<p><b>EVT.</b></p>		<p><b>INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:</b></p>	<p>2 g opløses i 40 ml infusionsvæske. Indgives over mindst 30 min.</p>