

ANVENDELSE AF PRÆPARATET: STESOLID DIAZEPAM

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

STYRKE / PAKNING:	Injektionsvæske 5 mg/ml	VIRKNING:	Centralt sederende og muskelrelaxerende.
INDIKATION:	Kramper, muskelspasmer, angst og uro.	BIVIRKNING:	Døsighed, svimmelhed, apathi, balanceforstyrrelser, eufori, tolerance- og afhængighed.
INTERAKTION:	Alkohol, neuroleptica og hypnotica forstærker effekten.	KONTRAINDIKATION:	Akut alkohol- og sovemiddelforgiftning. Myastenia gravis. Svær leverinsufficiens. Akut respirationsinsufficiens.
DOSERING:	Individuel 2.5 - 5 - 10 mg	INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:	Middel (ca. 1 ml/min).
SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:	Ved respiration ellerbevidsthedssvækkelse: antidot Lanexal 0.1 - 0.3 mg langsomt i.v.	EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:	Alm. elektrolytopløsning
EVT.		INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:	