

UNDERSØGELSESPROGRAM FOR AKUTTE OG SUBAKUTTE KNÆTRAUMER

INITIALE UNDERSØGELSER OG BEHANDLING:

Sufficient anamnese for skadesmekanismen optages. Stabiliteten skal også vurderes af l. reservelæge.

1. Røntgen af knæet i 2 planer, evt. horisontal undersøgelse af patella ved mistanke om patellaluksation.
2. Haemarthron uden fedtperler i aspirat
3. Haemarthron med fedtperler i aspirat
4. Strågul ledvæske

Ved ansamling foretages diagnostisk punktur, og alle patienter med haemarthron indlægges akut - subakut.

A Blodig aspirat uden fedtperler kan skyldes:

1. isoleret læsion af forreste korsbånd
2. sublaksation - luksation af patella
3. større menisklæsioner
4. udrift i mediale kapselapparat
5. læsion af de collaterale ligamenter med kommunikation til led
6. kombinationer af ovennævnte

B Blodig aspirat med fedtperler kan skyldes:

1. fraktur i tibiaplateauet
2. fraktur i femurkondyler
3. patellafraktur
4. osteokondrale frakturer
5. patellaluksation (hvor der ofte er en lille fraktur i distale- mediale del af patella)
6. frakturer med samtidige ligamentlæsioner

Hvor diagnosen ikke er oplagt 3) eller 5) indlægges pt. til tomografi i 2 planer, hvorefter plan for den videre undersøgelse og behandling afgøres.