

## ANVENDELSE AF PRÆPARATET: VILAN NICOMORPHIN

© OVL. HARDY CHRISTOFFERSEN & OVL. LIS KRØLL

<b>STYRKE / PAKNING:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 mg/ml injektionsvæske. 1 ml ampuller.</li> </ul>	<b>VIRKNING:</b>	Analgeticum af morfintypen.
<b>INDIKATION:</b>	Stærke smerter.	<b>BIVIRKNING:</b>	Kvalme, opkastning, forstoppelse, svimmelhed, eufori, vandladningsbesvær, respirationssvækkelse.
<b>INTERAKTION:</b>	OBS! ved samtidig indgift af MAO-hæmmere. Virkningen af neuroleptica forstærkes ligesom den sederende effekt af benzodiazepiner, alkohol og barbiturater.	<b>KONTRAINDIKATION:</b>	Ingen absolutte. Forsigtighed ved respirationslidelser og ved svær lever- og nyrelidelser.
<b>DOSERING:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 - 20 mg (0.5 - 2 ml) i.v.</li> <li>10 mg (1 ml) s.c. eller i.m.</li> </ul>	<b>INJEKTIONSMÅDE TILBEREDNING INJEKTIONSHASTIGHED:</b>	I.m., s.c. eller langsomt i.v.
<b>SPECIELLE FORHOLD OBSERVATIONER:</b>	Antidot: Narcanti 0.4 - 0.8 mg i.v. Kængentages 2 - 3 gange, hvis forbedring af respirationen ikke indtræder.  Vilan opbevares koldt.	<b>EGNEDE INF. VÆSKER HOLDBARHED:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NaCl isotonisk 9 g/l</li> <li>Glucose isotonisk 55 g/l</li> </ul> 12 timer
<b>EVT.</b>	<b>Bemærk:</b> hurtig toleranceudvikling ved i.v. indgift af alle morfica.	<b>INFUSIONSMÅDE TILBEREDNING INFUSIONSHASTIGHED:</b>	Langsomt indgift.